Ziekte van Pfeiffer:

De Ziekte van Pfeiffer is een besmettelijke infectieziekte en wordt ook wel infectieuze Mononucleose (I.M.) of kissing disease genoemd. Het virus nestelt zich in de speekselklieren waardoor het kan overgebracht door zoenen, maar ook door een eenvoudige verkoudheid of via druppeltjes speeksel. Pfeiffer komt vooral veel voor bij jongvolwassenen.

De ziekte wordt veroorzaakt door het Epstein-Barr virus (EBV). Vier tot zeven weken na de besmetting zullen de eerste ziekteverschijnselen optreden. Symptomen van Pfeiffer zijn vermoeidheid, keelpijn, koorts, lymfeklierzwellingen in hals of liezen en oksels. Vaak is er sprake van lever- en miltvergroting en gele verkleuring van de huid.

Door middel van een vingerprik met een lancet brengt u een druppeltje bloed aan op de testcassette. Voeg vervolgens 6 druppels van de bijgeleverde vloeistof toe.

Na minimaal 5 en maximaal 10 minuten is het resultaat af te lezen. De uitslag wordt afgelezen als positief of negatief. De test kan de aanwezigheid van deze antistoffen in uw bloed aantonen.

Lees voor het gebruiken van de test altijd eerst de bijsluiter volledig door.